

Lipoaspiration, liposculpture, lipofilling

La **lipoaspiration/liposuction** est indiquée chez les personnes présentant un **excès de graisse localisé sous une peau ferme** (p.ex. « la culotte de cheval », les hanches, l'abdomen, les cuisses, les genoux etc...). Son but est de diminuer localement la quantité de graisse sous-cutanée, afin de redonner une silhouette harmonieuse et mieux proportionnée. Malgré son extrême banalisation au cours de ces dernières années, elle doit être considérée comme une véritable intervention chirurgicale et ne constitue en aucun cas un traitement de l'obésité.

La **liposculpture haute définition** ou « **etching** » est une technique de lipoaspiration plus avancée qui permettra, dans certains cas bien spécifiques, de **réduire l'excédent** graisseux et de **définir et sculpter** les reliefs musculaires sous-jacents afin de remodeler le corps avec un niveau de définition plus important. Cette procédure va de pair avec une **hygiène de vie saine** et n'est proposé que chez les patients en bonne condition physique, avec un BMI entre 20 et 25 kg/m², sans comorbidités et non-fumeur. La liposculpture haute définition est contre-indiqué après perte de poids massive ou excédent cutané important.

Dans certains cas il est possible de profiter du tissu graisseux extrait pour « **remplir** » certaines régions jugées insuffisamment galbées (**lipofilling**). Cette procédure vous concerne si vous recherchez une **augmentation** du volume **naturelle et sans implant**, cela au niveau de la **poitrine**, des **fesses** ou de toute zone présentant une **asymétrie**, un **creux disgracieux** ou une **dépression cicatricielle**.

➤ Informations générales sur l'intervention

	Lipoaspiration	Liposculpture	Lipofilling
Prérequis	• Préparation par arnica et crème oxygénante		
Effets	• « Harmonisation » silhouette	• Définition des reliefs	• Augmentation, comblement
Hospitalisation	• Hôpital de jour ou 1 nuit		
Postopératoire	• Vêtement de contention pendant 4 semaines • Pas de sport pendant 2 mois • Reprise du travail après 1 ou 2 semaines		
Prise en charge mutuelle	• /		